

## **DIABETES EN EL ADULTO MAYOR**

El pasado 6 de octubre del presente año el Lic. Miguel V. Osorio Mota, Secretario General del SUNTBANOBRAS, inauguró el nuevo ciclo de pláticas con el apoyo de la Gerencia de Servicio Médico para llevar a cabo la plática **“Diabetes en el Adulto Mayor”**, al efecto contamos con la participación de la Doctora Renata Hernández Nava, quien de forma sencilla y amena abordó un tema tan complejo como lo es la diabetes mellitus y los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta para evitar complicaciones.

No cabe duda que es un tema que cada que se aborda se conocen aspectos nuevos como las complicaciones detectadas en pacientes que tuvieron Covid. Sin duda lo mejor es la prevención y para quienes lo padecen, seguir un estricto control médico para vivir sin mayores complicaciones.

Agradecemos a la Gerencia de Servicio Médico dependiente de la Dirección de Recursos Humanos que se retomem estos temas de sumo interés para todos nuestros pensionados y jubilados afiliados al SUNTBANOBRAS, estamos ciertos que podremos seguir llevando pláticas de interés para ellos.




HACIENDA BANOBRAS SUNTBANOBRAS CASA DEL JUBILADO

Plática  
« Diabetes en el adulto mayor »





Inscríbete a los correos:  
suntbanobras.casadeljubilado@gmail.com  
y jubiladoscoyoacn@yahoo.com.mx

**6 de octubre, 13:00 horas. Vía zoom**  
« Prevenir y detectar a tiempo, es una oportunidad para una vida saludable »




### AGENTES ORALES

Agente	Indicaciones	Precauciones	Contraindicaciones
Sulfonamidas	Se usan la sal de glicina o de sodio	En caso de hipoglucemia	Fuente renal, anemia (contraindicado en recién nacido < 2 meses, 11-12 años, embarazo)
Tiazolidinonas	Se usan oralmente	Bajo pH gástrico y niveles de insulina	Contraindicado en fallo cardíaco grave. Aumento riesgo de anemia hemolítica en adultos mayores, uso solo a 12 semanas
Sulfonamidas	Se usan oralmente	En caso de hipoglucemia	Enfermedad de PNI al inicio y todo 2 meses por el primer año. No usar en caso de embarazo o PNI, alteración de la coagulación (VIT-K), uso en CC, EPO, fósforo sérico
Sulfonamidas	Se usan oralmente	En caso de hipoglucemia	Enfermedad de PNI al inicio y todo 2 meses por el primer año. No usar en caso de embarazo o PNI, alteración de la coagulación (VIT-K), uso en CC, EPO, fósforo sérico
Insulina	Se usan oralmente	En caso de hipoglucemia	Enfermedad de PNI al inicio y todo 2 meses por el primer año. No usar en caso de embarazo o PNI, alteración de la coagulación (VIT-K), uso en CC, EPO, fósforo sérico
Insulina	Se usan oralmente	En caso de hipoglucemia	Enfermedad de PNI al inicio y todo 2 meses por el primer año. No usar en caso de embarazo o PNI, alteración de la coagulación (VIT-K), uso en CC, EPO, fósforo sérico
Insulina	Se usan oralmente	En caso de hipoglucemia	Enfermedad de PNI al inicio y todo 2 meses por el primer año. No usar en caso de embarazo o PNI, alteración de la coagulación (VIT-K), uso en CC, EPO, fósforo sérico
Insulina	Se usan oralmente	En caso de hipoglucemia	Enfermedad de PNI al inicio y todo 2 meses por el primer año. No usar en caso de embarazo o PNI, alteración de la coagulación (VIT-K), uso en CC, EPO, fósforo sérico



## HIPOGLICEMIA

Cuando hay riesgo moderado ( insuficiencia renal, hospitalización reciente) o elevado (enfermedad, fragilidad, múltiples comorbilidades, vive en un solo) de hipoglucemia, se recomienda usar agentes con bajo riesgo como inhibidores DPP4 o sulfonamidas de bajo riesgo.



**Atentamente**  
**Comité Ejecutivo Nacional**